

『 再度！ B型肝炎再活性化に注意 』

肝臓川柳



『 チャート図を ちゃーんと覚えて B肝チェック』

(ベタですが…orz、覚えて必ずチェックを)

肝トピックス4でも紹介しましたが、最近さらに大きく問題となっているB型肝炎再活性化について再度紹介いたします。B型肝炎ウイルスを持っていても肝炎を起こしていない人だけではなく、過去にB型肝炎にかかって今ウイルスが血液中にいない人

>>>(この人はB型肝炎ウイルスが肝臓に潜伏しています)は

免疫抑制剤や抗癌剤を使用するとB型肝炎ウイルスが再活性化され、血液中にウイルスが再出現したり増加したりして、肝炎を起こす場合があります。

◆やっかいなのはこの場合重症化し劇症肝炎で亡くなられる割合が多いことです。去年9月に厚生労働省より注意の勧告があり、『免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドラインの遵守』

すなわち、治療前に必ず

●HBs 抗原のチェック、

└陽性なら、即抗ウイルス剤投与

└陰性でも、次に HBc 抗体、HBs 抗体チェック

└どちらかが陽性なら月1回 HBV-DNA をモニターし


└HBV-DNA が陽性になったら

└即抗ウイルス剤を投与することが義務づけられました

最新の話題としては、HBV-DNA 測定は高価のため、

現在、超高感度 HBs 抗原測定が開発中（安価で、HBV-DNA とほぼ同じ感度）であり、

これが測定可能となればさらにこのアルゴリズムが一般化するものと思われます。



これだけ覚えておけば損はない！

今 回 の ポ イ ン ト

B型肝炎ウイルスを持っていても肝炎を起こしていない人だけではなく、過去にB型肝炎にかかって今ウイルスが血液中にいない人は（それでもB型肝炎ウイルスは肝臓に潜伏しています）免疫抑制剤や抗癌剤を使用するとB型肝炎ウイルスが再活性化され、血液中にウイルスが再出現したり増加したりして、肝炎を起こす場合があります。

(文： 福井県肝疾患診療連携拠点病院運営委員会 野ッ侯和夫)